

Cirugía de los labios: Queiloplastia

Existen procedimientos para **aumentar** y para **disminuir** el grosor de los labios

. Las técnicas de **aumento** de grosor de los labios pueden ser clasificadas en:

1.-Las que ofrecen **Resultados Temporales** en las que el efecto producido es limitado en el tiempo, y el material implantado es finalmente reabsorbido por el organismo, recuperándose la forma anterior. Dentro de esta categoría se encuentra el aumento de labios con colágeno, en las que el efecto permanece solamente unos meses (de 2 a 6).

2.-Las que ofrecen **Resultados Permanentes** o definitivos, en las que el efecto producido permanece por tiempo indefinido. En esta categoría podemos englobar las técnicas de:

- **Autoinjerto de Grasa** efectuada con la técnica de Lipoestructura, en la que el gran edema post-operatorio puede ser un inconveniente, y
- **Las Queiloplastias** o técnicas quirúrgicas de avance de la superficie interna del labio (mucosa) hacia el exterior mediante plastias en V-Y o en W-Y.

Para la **REDUCCIÓN** del grosor de los labios se utilizan técnicas de extirpación de mucosa de la parte interna del labio que está en contacto con los dientes, con las que se puede conseguir un adecuado contorno más proporcionado con el resto de la cara, sin la existencia de ninguna cicatriz externa. Sin cicatrices externas.

Asimismo, en Cirugía de Rejuvenecimiento Facial, es posible eliminar las arrugas que se han formado alrededor de los labios con el paso de los años .